ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

製品情報はこちらから
バファリンルナJ 検索

小・中・高校生にも
生理痛・頭痛に
〈解熱鎮痛薬〉 **バファリンルナJ** 第2類医薬品

バファリンには有効成分の異なる製品があります。本品の解熱鎮痛成分は**アセトアミノフェン**です。医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談する場合は、アセトアミノフェンとお伝えください。

- ☑ 年齢に応じた服用量で、小・中・高校生にも！
- ☑ 学校生活を邪魔しないよう、眠くなる成分を含まない。
- ☑ 水なしで飲めるチュアブル錠。（苦くないフルーツ味）

⚠ 使用上の注意

本剤は、小中高校生（7才以上）にも服用いただけますが、解熱鎮痛薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。



☒ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）

1.次の人は服用しないでください

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬

3.服用前後は飲酒しないでください

4.長期連続して服用しないでください

相談すること

1.次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
　心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍



2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症　状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

（必ず裏面もお読みください）

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症　状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときぜーぜー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効　能

(1) 月経痛(生理痛)・頭痛・腰痛・肩こり痛・筋肉痛・関節痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・歯痛・抜歯後の疼痛・神経痛・耳痛・外傷痛・咽喉痛の鎮痛　(2) 悪寒・発熱時の解熱

用法・用量

なるべく空腹時をさけ、かみくだくか、口の中で溶かして服用してください。
また、服用間隔は 4 時間以上おいてください。

年　齢	15才以上	11才以上15才未満	7才以上11才未満	7才未満
1回量	3錠	2錠	1錠	服用しないこと
服用回数	1日3回を限度とする			

〈用法・用量に関連する注意〉 (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。外出時に携帯させる場合には、事前に用法・用量など、服用方法をよく指導してください。(2) 用法・用量を厳守してください。(3) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)。



成 分 (1錠中)

有効成分	含　量	はたらき
アセトアミノフェン	100mg	痛みをおさえ、熱を下げます。

添加物として、エチルセルロース、ラウリル硫酸Na、セタノール、トリアセチン、合成ヒドロタルサイト、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、スクラロース、*l*-メントール、香料、デキストリン、バニリン、ステアリン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
(5) 変質の原因となりますので、服用なさらない錠剤の裏のアルミ箔に傷をつけないようにしてください。

■お問合せ先 お買い求めのお店又は下記にお問合せください
ライオン株式会社 お客様センター 0120-813-752
受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7